

Малярия

Малярия - тяжелое паразитарное заболеваний, широко распространенное в странах с тропическим и субтропическим климатом: Азия, Африка, Центральной и Южной Америки. Заражение происходит при укусах малярийных комаров. Отличия малярийных комаров от не малярийных: заключается в том, что малярийные комары имеют пятна на крыльях и при посадке тело располагает под углом к поверхности.

Источник инфекции - больной человек, бессимптомный носитель и переболевший тропической малярией.

Известны 4 формы малярии, из которых наиболее тяжелая - тропическая, распространенная в странах Африки. Инкубационный период составляет от 7 дней до 1 месяца при тропической малярии и до 3-х лет при других формах. Симптомы заболевания - повышение температуры, озноб, сильное потоотделение, головная боль, слабость. При тропической малярии без проведения своевременного лечения возможен смертельный исход в очень короткий срок от начала заболевания.

К 1955 г. заболеваемость малярией достигала 300 млн заболеваний в год, в связи с чем была принята программа ликвидации малярии ВОЗ.

К 70-м годам ареал заметно уменьшился, заболевание было ликвидировано в развитых странах, заболеваемость снизилась до 100 млн. случаев в год.

В настоящее время в мире 80% заболевших проживают в странах Африки, где более 1 миллиона людей ежегодно умирают от малярии.

В Беларуси местных очагов малярии нет.

Рекомендуемые меры профилактики малярии в странах Азия, Африка, Центральной и Южной Америки:

- на открытом воздухе для защиты от укусов комаров, в вечерние часы на непокрытые одеждой участки тела наносятся репелленты (средства для отпугивания насекомых);

- в помещениях при отсутствии кондиционера окна и двери следует засетчивать, перед сном включать электрический фумигатор, полог над постелью пропитывать репеллентами, а его края заправлять под матрац;

- лицам, регулярно выезжающим в неблагополучные по малярии страны, целесообразно иметь при себе в виде индивидуальной укладки.

- лицам, выезжающим в страны, в которых рекомендована сезонная химиопрофилактика малярии необходимо проконсультироваться у специалистов организаций здравоохранения.

*государственное учреждение
Гомельский районный центр гигиены и эпидемиологии»*